

توانا بود هرکه دانا بود

۲۷۳۵ ((دانشگاه تهر (ز)))

دانشکده
پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکتری از دانشگاه تبریز

موضوع

((واریس))

استاد راهنما


جناب آقای دکتر جواد مجلسی

نیکارش



طالبه - شهری

سال تحصیلی



۱۳۴۷

۲۸

۲۷۳۵

تقدیم به :

مہین عزیز و شاہنشاہ آریا مہرہ

۲۷۵۸

تقدیم به :

پدرم که سالها رنج و زحمت تربیت مرا برد و شرمناک است

انسانی خود تحمل کرده است.

تقدیم به :

مادر عزیزم که با محبت و مهربانی بی‌آلایش خود همیشه

• مشکلات زندگی را بر من آسان ساخته است .

تقدیر به :

برادر فداکارم علی که همیشه با کمکهای بیدریغ خود

- مراد را امر تحصیلی هدایت کرده است

تقدیر پرہ :

• خواہسراں عزیزم کمشوق من د را مر تحصیلم بید ہاند •

تقدیرنامه :

استاد دانشمند و بزرگوارم جناب آقای دکتر جواد مجلسی

تقدیم به :

دوستان عزیزم سارا و منظر عزیزم که در شادیهها و غمهای من شریک بود مانند •

(فهرست ضمیمه درجات)

- ۱- تعريف و کلیات •
- ۲- اتیلوژی •
- ۳- بافتشناسی •
- ۴- شرح ویرید اندام تحناتی •
- ۵- آسیبشناسی •
- ۶- فیزیوپاتولوژی و ارس •
- ۷- علامت بالینی •
- ۸- سیر و عوارض •
- ۹- معاینه •
- ۱۰- ابرواسیروزها •

۱۳۶۷ - ۴۸
ش ی و ا ر ی س
۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

” واریسها ” Varuces

تعريف و کلیات :

واریس یا فلپکتازی عبارت است از اتساع دائمی و مرضی ورید های مختلف بدن است که تولید تومورهای کوچک نرم منبساط و همراه اند با ضایعات مزمن جداره .

ضایحه • ضایعات تشریحی وریدها بدینقرار است : واریس در کلیه سیاهرگهای بدن ممکنست تولید شود • مثلاً در ورید های آنورکتال ایجاد بیماری - همورئید را میکند و واریس ورید های کوردن اسپرما تیک تولید واریکوسل مینماید • پیش زنان واریسهای وولورود رنزد بیماران سپروتیک واریس مری دیده میشود ولی در اینجا منظور بحث درباره واریسهای اندامهای تحتانی است • اصولاً در ادبیات پزشکی کلمه ” واریس ” خالص ب واریس های اندام پائین اطلاق میشود •

اتیولوژی - بطور کلی دودسته واریس شرح داده شده است • واریسهای - اولیه و واریسهای ثانوی •

واریسهای ثانوی بر اثر يك مانع کانلیکی که در جریان بازگشت خون وریدی قرار میگیرد

بوجود میآیند • که ممکنست این مانع يك تومور شکمی که در مجاورت تنه وریدی های

بزرگ واقع شده باشد • (واریسهای حاملگی) و یا بطور روشن بعلت -

يك ترومبوز وریدی بالای اندام بوجود میآید آنچه که در این فصل تحت بررسی

قرار میگیرد واریسهای اولیه است که علت اصلی آن کاملا شناخته نشده

ولی عواملی در بوجود آمدن آنها دخالت دارند •

۱ - سن - درباره دخالت سن عقاید زیادی وجود دارد که بعضی از آنها

بدین قرار است : **Mesen** عقیده دارد که واریس در ۱۷ درصد افراد

در همه ادوار زندگی دیده میشود ولی **Anderson Mc Pheeters**

پورسانتاژ واریس را در سنین مختلف حساب کرده و جدول زیر را تهیه نمود :

۲۰ - ۳۰ سالگی	۱۸/۱ درصد	۱۰ - ۷	سالگی	يك درصد
۴۰ - ۴۰	۲۴/۷۵ درصد	۳۰ - ۴۰	"	۲۷/۵ درصد
۶۰ - ۷۰	۱۰/۸ درصد	۵۰ - ۶۰	"	۱۶/۵ درصد
		۷۰ - ۸۰	"	۱/۱۵ درصد

Bernslen عقیده دارد که ۷۵٪ واریسها قبل از ۳۰ سالگی شروع میشود

۲- جنس - طبق آمار برنستن هر دو جنس بطور مساوی باین بیماری مبتلا میشوند

جدولی توسط مولف قبلی تهیه شده مرد وزن بترتیب بر شانس ابتلا -

باین بیماری را دارند *

در ۱۰ سالگی هر دو جنس بطور مساوی بین ۲۰ - ۳۰ سالگی به نسبت ۴ زن

بیک مرد بین ۳۰ - ۴۰ سالگی ۳ زن بیک مرد بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی ۴ زن بیک مرد

طشزادی تعداد زنها حاملگی است و در مرد ها بیشتر شغل و سرپا ایستادن -

در بروز بیماری دخیل است *

۲- ارت - اکثریت را عقیده بر این است که ضعف جدار وریدها بطور -

ارثی در ایجاد واریس فریق الحاده مؤثر است در روی چنین زمینه ایست که اگر

فشار وریدها در اثر ایستادن زیاد و یا فشار داخل شکم بعلت سرفه و زورزدن و

غیره زیاد شود واریس به سهولت ایجاد میگردد Detbet با اندازه گرفتن

فشار ورید در این بیماران مشاهده کرده است که در حال استراحت ۱۶ میلیمتر

جیوه بوده ولی در حال حاضر به ۷ سانتی متر جیوه رسیده است در صورتیکه

در حال طبیعی هر دو فشار تقریبا برابر است.

۴- اورتو ستاتیسیم • بطور قطع ایستادن زیاد در ایجاد واریس رل مهمی

دارد و روی این اصل است که واریس در دستها خیلی نادر بود و اکثرا در

اندامهای تحتانی شکم ایجاد میشود •

۵- زمینه جراحی • بطور کلی افراد چاق استعداد بیشتری بگرفتن واریس

دارند زبانی چرسی شکم موجب فشار ببرد اجوف تحتانی و وریدهای

ایلیاک شده است و در ضمن واریس غالباً با آتروفی پوست مثل آتروفی ایدرو-

پاتیک منتشر یا آکرو درمیت مزمن همراه است.

۶- عدد دانلی - عده اعزاز مولفین موضوع عدد داخلی را در بروز واریس دخیل

دانسته اند و دلیل آنها هم بروز پیشرفت واریس در دوره بلوغ حاملگی -

و تغییر است ولی باید دانست که این دلایل چندان اهمیت ندارد زیرا

دوره بلوغ دوره رشد بدن است و هرگونه تغییری ممکنست در اورگانهای -

بدن ایجاد شود ثانیاً در دوره حاملگی تغییرات بسیار زیادی در بدن

حاصل میشود که هر کدام میتوانند در ایجاد واریس مؤثر باشد ثالثاً دوره-

همچون نیز دوره شروع آترونی ویری همه انساج است که ورید ها

نیز جزو آنها میباشند .

۷- عفونتها - بعضی ها عقیده دارند که انفکسیون یا توکمی انفکسیون

روی درجه ورید ها اثر کرده و آنها را خراب میکنند این قضیه ناشی -

از اینست که در جریان بیماریهای عفونی مانند تیفوئید و یا پنومونی

واریس زیاد دیده شده است ولی باید دانست که اینها واریسهای ثانوی -

هستند که بدنسال ترومبو فلیت ناشی از عفونتهای فوق بوجود آمده است

۸- حاملگی - در جریان حاملگی خصوصاً حاملگی های چند قلو واریس

زیاد دیده میشود . یکمتر احتمال دارد که اگر رزی ضعف جدار وریدی

داشته باشد و بعد از دوره وضع حمل دچار واریس نشود . علت این

امریکی فشار خود رحم و دیگری افزایش فشار داخل شکم بوده و موسم -

زیادی خون ورید ایلیاك داخلی است که موجب ازدیاد جریان خون در این

ورید شده و در نتیجه جریان خون ورید ایلیاك خارجی نیز دچار استاز -

میگردد .

بافت شناسی :

بطور کلی جدار ورید از سه طبقه تشکیل یافته که از داخل

بخارج عبارتند از :

۱ - پرده درونی - این پرده بتنهائی از سه طبقه تشکیل شده است که -

بترتیب از داخل بخارج عبارتند از :

الف - در قسمت داخلی سلولهای پوششی که بشکل سلولهای پوششی -

پهن هستند مشاهده میشود این سلولها کوتاهتر از سلولهای تیغی

شراین بوده ولی پهن تر از آنهاست .

ب - در زیر طبقه پوششی طبقه آندرون که از یافت همبند نازک ارتجاعی

ویشینی بنا شده که اغلب رشته های آن طولاً در امتداد ورید قرار دارند

این طبقه ممکنست در بعضی نقاط بی اندازه نازک شده حتی وجود نداشته باشد .

ت - در خارج دو قسمت فوق تیغه ارتجاعی داخلی که اغلب بواسطه ساختار

پریفی که داراست بد شواری میتوان آنرا مشاهده کرد باید دانست که پرده

درونی در بعضی نقاط در داخل ورید تولید چین خوردگیهای رافی نماید