

تیرماه  
۹۷

دانشگاه تهران

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه

برای دریافت دکترا از دانشگاه تهران

موضوع:

ضایعات غدد بزاقی

براهنماei:



استاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی شریعتمداری

نگارش:

آرقسی آواکیان

شماره پایان نامه ۱۶۸۲

سال تحصیلی ۳۵-۲۵۲۴



۲۱۰۹

تقدیم به:

ساده زیرزم

M1c9

تمسیدیم بسته :

استاد ارجمند جناب آنای دکتر تقی شریعتمداری  
ریاست محترم بخش آمار و بررسی‌های پاتولوژی  
انستیتو تاج پهلوی

با تشکر از کمک‌ها و راهنمائی‌های  
ارزنده ایشان

تہذیب بسہ

هیأت محترم قضات

باتشک رار:

کنیسه استادان و هیات محترم علمی و تحقیقاتی داستکده دندانپزشکی  
که مرا در این مهتمم یاری نموده اند.

باتشک راز :

زحمات آقای ارشاد هماوندی که در تحریر این پایان نامه  
مرا یاری نموده اند .

## فهرست متن درجات

	عنوان
۱	مقدمه
۳	بررسی مآخذ علمی
۵	مواد و روش بررسی
۸	نتیجه
	بحث
۲۶	انواع عدد براقی
۲۷	رشد و تکامل عدد براقی
۲۸	ساختمان طبیعی عدد براقی
۴۲	اصول بیوپسی در تشخیص ضایعات عدد براقی
۴۴	اختلالات رشدی نکاملی عدد براقی
۴۵	اختلالات عملی عدد براقی
	تغییرات آماسی عدد براقی
۵۰	تورم عدد براقی به علت جسم حارجی
۵۰	تورم عدد براقی با منشاء باکتریال
۵۶	تورم عدد براقی با منشاء ویروسی
۵۸	تورم عدد براقی با منشاء آلرژیک
۶۳	سنگ براقی
۶۶	کیسته‌های عدد براقی
	ضایعات تومور اال عدد براقی
۷۴	طبقه بندی
۷۶	آدنوماها - پلئومورفیک آدنوما

## عنوان

## صفحته

۹۷	منومورفیک آدنوماها
۹۸	آدنولتفوما
۱۰۸	اکسی فیلیک آدنوما
۱۱۳	سایر آدنوماها
۱۱۵	آدنوم توبولر
۱۱۵	آدنوم با سلولهای روش
۱۱۹	آدنوم بازو سلولر
۱۲۰	آدنوم ترابکولر
۱۲۲	آدنوم سباسه
۱۲۷	موکوپی درموئید تومور
۱۴۲	تومور آسینیک سل
۱۵۲	آدنوئید سیستیک کارسینوما
۱۶۴	آدنوکارسینوما
۱۷۰	اپی درموئید کارسینوما
۱۷۳	کارسینوم اندیفرانسیه
۱۷۸	کارسینوم در پلئومورفیک آدنوما
۱۸۵	تومورهای بافت همبندی و سایر تومورهای اولیه
۱۹۱	تومورهای متابستاتیک در غدد براقی
۱۹۴	تومورهای غدد براقی در کودکان
۱۹۷	خلاصه و نتیجه
۲۰۲	فهرست منابع و مأخذ

## مقدمه

ضایعات غدد براقی یکی از مباحث مهم آسیب شناسی دهان را تشکیل میدهدند که بخصوص از نظر تشخیص هیستولوژیک ، نامگذاری و طبقه بندی اشکالات و اختلاف نظرات فراوانی را به وجود آورده اند ، باید توجه داشت که ضایعات غدد براقی متعدد هستند که از جمله میتوان اختلالات رشدی نکاملی ، اختلالات عملی ، ضایعات آماسی کیستها و بالاخره تومورهای غدد براقی را نام برد . اغلب این ضایعات نمای کلینیکی مشابهی دارند که بصورت تورم میباشند بهمین دلیل بسیاری از ضایعات غدد براقی "استباهها" به عنوان پلئومورفیک آدنوماتومور میکست که شایع ترین تومور غدد براقی است تشخیص دادمشده و درمان میشوند و حال آنکه ممکن است این ضایعه توموری بد خیم و یا بیماری آماسی باشد که در این حالات مشی بیماری و درمان آن کاملاً متناآوت خواهد بود و در اینجا اهمیت آزمایش هیستولوژی در تشخیص این دسته بیماریها معلوم میگردد .

در ضمن باید در نظر داشت که امروزه آمار در تمام رشته های تحقیقاتی و بخصوص پژوهشی به منظور تشخیص و درمان بیماریها نقش اساسی دارد .  
کشورهای پیش رفته جهان برای این جنبه از تحقیقات اهمیت خاصی قائل میشوند .  
بادر نظر گرفتن مطالب فوق و با توجه به این نکته که تاکنون آمار جامع و کاملی در مورد میزان شیوع این ضایعات در ایران وجود نداشته است، لذا بنا به پیشنهاد استاد عزیز جناب آقای دکتر شریعتمداری موضوع حاضر را عنوان پایان نامه خود انتخاب کردم .

بنابراین تکیه اصلی در این پایان نامه بر روی جنبه های آسیب شناسی و آمار این دسته از ضایعات میباشد که بخصوص از نقطه نظر آماری در این پایان نامه توجه خاصی مبذول شده است . در زمینه اخیر با کمک ها و راهنمائی های ارزنده جناب آقای دکتر شریعتمداری ریاست محترم بخش آمار و بررسی های پاتولوژی استیتو تاج پهلوی توانستم به تمام منابع لازم دسترسی پیدا کرده و آمار بیست ساله مربوط به ۱۳۶۶ بیمار را جمع آوری و بررسی کنم که نتایج حاصله همراه با نمودارها و جدولهای مربوط به نظر خواهد رسید .

## بررسی منابع و مأخذ

ضایعات غدد براقی بسیار متنوع و شایع هستند و اغلب آسیب شناسان

بخشی از کتاب خود را به این مطلب اختصاص داده اند مثل Anderson<sup>3</sup> Thoma<sup>30</sup> Robbins<sup>21</sup>

مقالات متعددی در بارهٔ ضایعات گوناگون غدد براقی نوشته شده قدیمی ترین مقالاتی که مورد مطالعهٔ من قرار گرفتند مربوط میشود به کشورهای اروپائی مثل

آلمان و فرانسه از آنجلمه میتوان مقاله‌ای را که Billroth<sup>4</sup> در سال ۱۸۵۹ Thorowgood<sup>31</sup> در بارهٔ ضایعات غدد براقی به زبان آلمانی نوشته و یا مقاله Sjougren<sup>26</sup> در بارهٔ سنگ براقی که به زبان انگلیسی در سال ۱۸۷۲ نوشته شده. در سال ۱۹۳۳ در بحثی در بارهٔ ضایعات آلرژیک غدد براقی سندروم Sjougren را که یک بیمار اتوایمیون میباشد شرح داد.

یکی از قدیمی ترین کتابهایی که در آن تومورهای غدد براقی به طور کامل شرح داده شده مربوط میشود به سال ۱۹۵۴ به نام اطلس تومورهای غدد براقی که در آن Frazel<sup>12</sup> و Foote<sup>12</sup> از آمریکا مشاهدات ۲۰ ساله خود را در بیمارستان Memorial بر روی ۹۰۰ بیمار مبتلا به تومورهای غدد براقی شرح داده اند. Eneroth<sup>10</sup> از سوئد در سال ۱۹۶۴ کتابی تحت عنوان مشاهدات کلینیکی و آسیب شناسی تومورهای غدد براقی نوشته و در آن مذکور شد که نئوپلاسمهای غدد براقی در کمتر از ۳ در ۱۰۰۰ نفر از جمعیت یک کشور اتفاق میافتد و در سال ۱۹۷۱ بعد از مطالعه یک سری بیمار شامل ۱۳۲۸ مورد تومور غدد براقی که از نظر تعداد بیماران مورد مطالعه قرار گرفته بی نظیر میباشد مقاله‌ای –

منتشر نمود و در آن نسبتیاً مختلط انتشار تومورهای ابی تلیال غدد بزاقي را در  
غدد پاروتیدو تحت فکی بررسی نمود .

Vawter<sup>32</sup> و Tafft در سال ۱۹۶۶ تومورهای مادرزادی غدد بزاقي را  
شرح دادند در حالیکه Cameron<sup>6</sup> در سال ۱۹۵۹ دو تومور مادرزادی غدد بزاقي را  
در دو بیمار زن در یک خانواده گزارش نموده بود .  
Cruickshank<sup>11</sup> و Evans<sup>11</sup> در کتاب تومورهای ابی تلیالی غدد  
بزاقي ضمن گزارش آمارهای مختلف از کشورهای مختلف در باره شیوه سنی و انتیو

لوژی و هیستولوژی هر یک از تومورهای غدد بزاقي بحث نمودند .

آخرین و کاملترین کتابی که در باره تومورهای غدد بزاقي مورد مطالعه قرار  
گرفت مربوط است به Thackray<sup>29</sup> و Lucas<sup>29</sup> که تجربیات بیست ساله خود  
را بر روی ۲۱۴ بیمار کتابی تحت عنوان تومورهای غدد بزاقي بزرگ انتشار دادند و  
در آن شرح کاملی از آمار گزارش شده هیستوری علائم کلینیکی ، ماکروسکوپی و -  
میکروسکوپی ، درمان و تشخیص افتراقی تومورهای مختلف غدد بزاقي ذکر نمودند .

### مزاد و روش بررسی

روش :

در این بررسی بیمارانی در نظر گرفته شدند که از تاریخ ۲۵۱۵ تا ۲۵۳۵ شاهنشاهی به انتستیتو تاج پهلوی که تنها مرکز علمی و رسمی تحقیقات آسیب شناسی میباشد مراجعه کرده بودند.

روش کار به این ترتیب بود : پرونده، تمام بیمارانی که در طی این بیست سال به این مرکز مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفت و پرونده های مربوط به ضایعات غدد برازی مجزا شدند . سپس پرونده های ضایعات مختلف غدد برازی را زیکدیگر جدا کرده به مطالعه دقیق آنها مبادرت گردید . هر یک از ضایعات بر حسب محل وغده ای که گرفتار شده بود و همچنین سن و جنس بیمار بررسی شد . نتایج بیوپسی ها و لامهای تهیه شده از این بیماران در اختیار بودند که در موارد لزوم به آنها مراجعه میگردید . بعد از مطالعه پرونده ها با توجه به محتویات آنها جدولها و نمودارهائی رسم گردیدند . نتایج به دست آمده با آمار گزارش شده از سایر کشورها مقایسه گردیدند که در قسمت نتیجه از نظر خواهد گذشت .

مواد :

در این مدت ۲۵ سال تعداد ۱۰۹۳۶۶ بیمار به این مرکز مراجعه کرده بودند که ۷۱۶ نفر از آنها ببتلا به ضایعات غدد برازی بودند . جدول شماره ۱ نمایانگر ضایعات گوناگون غدد برازی و درصد آنها میباشد . چنانکه از این جدول بر می آید تومورها با ۵۸۶ مورد بیشترین تعداد و درصد را به خود اختصاص داده اند ، ولی باید گفته شود که این درصد نمی تواند رسم صحيحي

برای شیوع این ضایعات باشد چون تومورهای غدد برازی در مقایسه با سایر ضایعات مثل آماسی و کیستیک کمتر اتفاق میافتد. ولی به علت اینکه این ضایعات به آسانی به طریق بالینی و پرتونگاری تشخیص داده و درمان میشوند تعداد کسانی که برای بیوپسی مراجعه میکنند کم هستند.

جدول شماره ۱ - نسبت انواع مختلف ضایعات غدد برازی

در ۷۱۶ مورد ( استیتو تاج پهلوی ۲۵۳۵ - ۲۵۱۵ )

درصد	تعداد	نوع ضایعه
۰/۴۱	۳	رشدی تکاملی
۱۵	۱۰۸	آماسی
۲/۶۶	۱۹	کیستها
۸۱/۹۳	۵۸۶	تومورها
۱۰۰	۷۱۶	کل ضایعات

جدول شماره ۲ نمایانگر تعداد زنان و مردانی است که به ضایعات گوناگون

غدد برازی گرفتار شده بودند.

جدول شماره ۲ - شیوه ضایعات مختلف غدد براقی بر حسب  
جنس ( انتیتوتاج پهلوی ۲۵۳۵ - ۲۵۱۵ ) در ۷۱۶ مورد

نوع ضایعه	تعداد	زن	مرد
رشدی تکاملی	۳	-	۳
آماسی	۱۰۸	۲۹	۷۹
کیستها	۱۹	۱۰	۹
تومورها	۵۸۶	۲۶۲	۳۱۴
کل ضایعات	۷۱۶	۳۰۱	۴۱۵