

پایان نامه

برای دریافت درجه فوق لیسانس علوم بهداشتی

در رشته آمار زیستی و بهداشتی


موضوع: بررسی آماری محتادین به تریاک در شهر نوشیر

براهنمائی

جناب آقای دکتر وارتکس نها پتیان

نگارش: پرویز کمالی

سال تحصیلی ۱۳۵۲-۵



تقدیم به :

استاد گرانقد رجistan آقای دکتر وارنکس نهاد پتیان

۱۹۰

تقدیم به:

آذر

بد ینویله از راهنمایی های با ارزش دوستان و همکاران عزیز:

آقای دکتر حسین ملک افضلی

آقای دکتر فیروز آزادگان

تشکر میکنم.

فهرست

<u>صفحه</u>	<u>موضوع</u>
۱	مقدمه
۴	اهمیت موضوع
۵	بررسی اطلاعات موجود
۷	هدف و نحوه بررسی
۸	مطالعه میزان مصرف تریاک با سالهای اعتیاد
۱۶	مطالعه میزان مصرف تریاک و مصرف روزانه سیگار
۱۸	مطالعه میزان مصرف تریاک و الكل مصرفی
۱۹	مطالعه میزان مصرف تریاک و چای
۲۲	مطالعه میزان مصرف تریاک و سواد
۲۳	مطالعه میزان مصرف تریاک و درآمد
۲۵	مطالعه سن درهنگام شروع اعتیاد
۲۶	مطالعه میزان درآمد - سالهای اعتیاد و میزان مصرف تریاک
۳۱	خلاصه فارسی
۳۵	خلاصه انگلیسی
۶۱	منابع مورد استفاده

مقدمه

مسئله اعتیاد یکی از قابل توجه ترین مسائل اجتماعی میباشد . البته اعتیاد یک مسئله جدید از تحفه های قرون اخیر نبوده چه از ابتدای تاریخ بشریت انسان کم و بیش برای تریز از دردهای روزمره زندگی باعتیاد پناه بوده است . ادبیات ابتدائی و افسانه های کهن ملل همگی کم و بیش راجع به پناه بردن انسان بمسکرات بحث میکنند . در این قرن که دولت ها مسئولیت بیشتری در مقابل اجتعاع و فرد احساس میکنند مسئله اعتیاد بیشتر در خورمطالعه قرار گرفته است . یک مسئله جالب توجه اینستکه آیا در اثر پیشرفت تمدن در قرون اخیر افراد بیشتری مبتلا به اعتیاد میشوند ؟ شاید جواب دادن باین سوال آنقدر که بنظر میرسد ساده نباشد آنچه میتوان تصور کرد اینستکه چون مسئله اعتیاد با نوع شخصیت فرد معتبر و زمان کوکی وی بستگی دارد و دران کوکی وی چه در قرون بسیار گذشته و چه در قرون اخیر کم و بیش یکسان میباشند پس ناراحتی های مربوط به محیط که بیشتر امکان دارد که فرد مستعد را در چار نوروز کند کمتر قادر به مختار کردن افراد میباشد .

یک مسئله دیگر که باید افزوده شود اینکه اعتیاد در زمان کنونی بیشتر مورد نظر قرار گرفته است و این شاید باین علت باشد که اعتیاد درازمنه گذشته بیشتر بصورت قسمتی از سنت هر اجتماعی محسوب میگردد و قابل تحمل تر بود . در قرن بیستم اعتیاد همچنان ادامه دارد و تنها نوع موادی که مورد استفاده قرار میگیرند تغییر پیدا کرده است . اعتیاد بالکل همچنان بشکل سابق وجود دارد . هروئین جانشین تریاک و مرفین شده و LSD کم کم دارد جایگزین حشیش میگردد .

چرخ دوران نورد سازد هر ضمیف وسست را همتی کن گند ماتاسنگ گندم سا شوی

لغت "افیون" از کلمه یونانی Option اخذ شده و بمعنی "چرت آورنده" میباشد.

لغت فارسی آن هپیون است. یحتمل که یونانی‌ها این کلمه را در زبان خود استخدام کرده و یا پارسیان قدیم از یونانی اقتباس کرده‌اند. انگلیسی و فرانسه Opium میباشد.

کلمه هپیون در اشعار قدیم آمده است مثلاً "ناصر خسرو میگوید:

داد کن ارnam نیک شواهی ازیران عقل تورا هزل دشمن است چو هپیون

امروزه لغت تریاک به معنی افیون مصرف میشود که در اصل بمعنی ضد زهر و

شوینده زهر است و معلوم نیست که چگونه لغت تریاک جای افیون را گرفته است.

شاید تریاک‌ها برای ستایش این نام را برآن نهاده و یا دیگران از سر تمسخر لغت تریاک را بکاربرد هاند.

حافظه گردید:

دل ما را که زمار سر زلف تونجست ازلب خود بشفا خانه تریاک انداز

تاریخچه: اطباً قدیم تریاک را میشناخته و به خواص آن آشنائی داشته‌اند. معلوم

نیست که آیا بقرار این خواص تریاک آشنائی داشته ویانه ولی "نیاکوراس" فیلسوف و

پزشک معاصر آنرا بکار میبرد هاست و جالینوس حکیم هم تریاک را تجویز میکرد هاست.

از اطباً اسلامی ابن‌سینا و رازی اولین کسانی بودند که خواص تریاک را بدقت

مورد مطالعه قرار داده و اهمیت زیادی برای آن قائل بودند و اروپائیان هم که از منابع

علمی اسلامی استفاده میکردند و در طب هم از زیشکان اسلامی پیروی مینمودند به اهمیت

آن پی بردند و آنرا زیاد استعمال میکردند.

مسلم نیست که کشت خشخاش از چه محلی شروع شده ولی بعضی حدس میزنند که زراعت و تجارت آن از آسیای صغیر و شبه جزیره آناتول شروع شده و از آنجا به نقاط دیگر سرایت نموده و در مالکی مثل هند ایران ترکیه چین و مصر رواج یافته است. زمانی بود که تهیه و مصرف تریاک در چین بسیار شایع بود بطوریکه علاوه بر مصرف محصول داخلی نمود درصد (۹۰٪) تریاکی که در هند تهیه میشد در چین بمصرف میرسید و از این راه سود فراوانی نصیب شرکت تجاری هند گردید انگلیسی بود میشد.

در اروپا تریاک برای تهیه ترکیبات داروئی مصرف میشود و بطور کلی در حدود نمود درصد تریاک دنیا برای تهیه شربت‌های سرفه استعمال میشود.

در چین ابتدا جویدن آن وسیس در او باسط قرن هفدهم کشیدن نمود آن مرسوم شد و در این زمان تقریباً «مه افراد به آن آلوه بودند ولی بعد ها مصرف آن در قسمت اعظم خان چین ممنوع شد و بواسطه صجازات‌های سنگین بغير از چین ملی در سایر نقاط چین اعتیاد ریشه گن شده است. مطابق گزارشی که توسط دولت چین ملی منتشر شده بین سالهای ۱۸۵۵ تا اواسط ۱۸۵۶ تقریباً دویست هزار معتاد در هنگ کنگ وجود داشته که در حدود پنجاه هزار (۵۰۰۰۰۰) آنها دستگیر شده‌اند و گفته میشود که معتادین هنگ کنگ سالانه در حدود یکصد و هفتاد میلیون دلار صرف داروهای مخدر میکنند. از ۴۴۰۶ نفر معتادی که در دسامبر ۱۸۶۰ در آمریکا شناخته شد ۹۵٪ / ۵۶٪ آنرا سیاهان تشکیل میدارد مانند راکتر معتادین آمریکا یعنی بیش از ۵۰٪ در رایالت نیویورک میباشد و بیش از نیمی از معتادین آمریکا بین سنتین بیست و یک سالگی تا سی سالگی میباشد و کمتر از ۴٪ افراد کمتر از ۲۰ سال میباشند در صورتیکه معتادین بالاتر از ۴۰ سال فقط ۱۰٪ را تشکیل میدهند.

طبق آمار انجمن مهارزه با تریاک والکل ایران در سال ۱۳۲۸ سه گروه از افراد (۰۰۰۵۰۱ نفر) در ایران مبتلا "بتریاک بودند" - روزانه در حدود دو هزار کیلو تریاک در این مرکز زود ریس میبردند. در تهران بیش از ۳۰ شیره کش خانه دایر بوده و در سال ۱۳۲۴ (فقط در شهر شیراز مصرف تریاک برای کشیدن ۵/۴ تن بوده است. مضرات تریاک عبارتند از:

- ۱- استقامت و پشتکار افراد معتاد ازین میروود زیرا استعمال تریاک بواسطه نشئه‌ای که دارد احساس احتیاج را ازین برد و شخص لای بالی میکند
- ۲- کاهش قدرت جسمانی و نتیجتاً کاهش بازدهی کار و بد نیال آن فقرات اقتصادی
- ۳- بوجود آوردن بی انضباطی بین توجهی به کار، قوانین، بهداشت و قراردادهای

اجتماعی

- ۴- ضعف امیال جنسی و در نتیجه نداشتن علاقه به همسر و خانواره
 - ۵- از نظر سیاسی بهترین وسیله استعمار
- باتوجه به اهمیت اجتماعی و اقتصادی وبهداشتی و حتی سیاسی موضوع لازم است تحقیقات دامنه داری در زمینه‌های: علل اعتیاد - انواع اعتیاد - گروههای اجتماعی آسیب پذیر - راههای درمان و روشن کردن جوانان از خطر اعتیاد بعمل آید.

بررسی اطلاعات صوبه‌ود

در زمینه انواع اعتیاد مطالعات زیادی در خارج از ایران بخصوص توسط سازمان بهداشت جهانی و داخل کشور انجام شده است. این نوع مطالعات پا به صورت ارائه اعداد و ارقام و یا با صورت مقالاتی است که بیشتر از جنبه های روانشناسی علل اعتیاد و روانشناسی اجتماعی بحث شده است. تحقیقاتی برآسان آزمون های آماری و نتایج علمی مبتنی باشد بسیار کم رناد راست. تحقیقاتی که در ایران انجام یافته است یا توسط مدکاران آموزشناهی عالی خدمات اجتماعی است یا توسط دایره تحقیقات مرکز بهداشت روانی شیراز است. گاهگاهی نیز مسئله بعنوان پایان نامه تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاهی بچشم می‌شود که از نظر محتوی باز نتایج مبتنی بر محاسبات آماری دقیق نیست.

چون بعضی از عواملی که در تحقیقات مرکز بهداشت روانی شیراز مورد بررسی قرار گرفته با عوامل مورد بررسی در این پایان نامه مشابه است لذا خلاصه‌ای از نتایج بررسی مرکز بهداشت روانی شیراز که نزد ۱۸۰۰ نفر معتبر به تریاک از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۴۶ انجام گرفته نشیار "شرح داده می‌شود :

از نظر شغل

مشاغل آزاد و پیشه‌وران	۶۰ درصد
کارضدان دون پایه	۱۲/۶ درصد
بقیه مشاغل	۲۲/۴ درصد
پایه تحصیلات :	۴۸/۴ درصد

دارندگان گواهینامه ششم ابتدائی

بالاتر از ششم ابتدائی

مدت اعتیار

٤/٦٤ درصد

سابقه ٥٠-

١/١٢ درصد

سابقه ١٠٠-

٥/١٨ درصد

سابقه ٢٠ +

مقدار مصرف :

٦/٢٨ درصد از معتاد بین بین ٦ تا ١٠ گرم روزانه وحداقل مصرف ٥٠ گرم و

حداکثر ٦٠ گرم در روز .

طرز مصرف

٦/٧ درصد

خوردن

٤/٦٢ درصد

کشیدن یا کشیدن و خوردن

درآمد روزانه

حداقل درآمد روزانه ٢٠ وحداکثر آن ٢٠٠ ریال . درآمد متوسط ١٥٠ ریال

در روز .

هدف و نحوه بررسی

این مطالعه برای روشن شدن رابطه میزان مصرف تریاک نزد مرد و زن با عواملی چون :

۱- درآمد روزانه

۲- سابقه اعتیاد

۳- سن اعتیاد

۴- سواد

۵- اعتیادات دیگر (چای - الکل و سیگار)

۶- مقایسه تمام عوامل فوق در مرد و زن

در نزد تمام افراد (۰۰۰ مرد و ۱۰۰ زن) معتاد به تریاک در شهر نوشهرگه برای دریافت

سهمیه ماهانه بود بد رمانگاه وزارت بهداشت در این شهر مراجعه نمیکردند از طریق نمونه برداری

(تعداد نمونه ۱۰۰ نفر یعنی به نسبت $\frac{1}{5}$ شامل ۷۹ مرد و ۲۱ زن) در آردی بهشت

ماه سال ۱۳۵۲ انجام گرفت.

اطلاعات جمع آوری شده ابتدا بصورت لیست و سپس بصورت جدول توزیع فراوانی منظام شد.

رابطه کلیه عوامل با میزان مصرف تریاک از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیدا کردن محادله

ریگرسن انجام شد. عواملی که دارای ارتباط معنی دار نبودند حذف و عواملی که دارای

ارتباط معنی دار بودند بین خود شان مجدد و مصرف تریاک برسیله ریگرسن چند متغیره

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقایسه بخصوصی از عوامل در نزد زن و مرد از طریق آزمون های معنی دار بودن چون آزمون t^2

و آزمون X^2 انجام گرفت.

از هر آزمون یا ضریب همبستگی یا محاسبه تفقط جزئیات محاسبات و فرمولهای یک مورد ارائه شده و در بقیه موارد به ذکر نتیجه اکتفا شده است.

۱- مطالعه میزان مصرف تریاک با سالهای اعتیاب

الف : مصرف روزانه تریاک

جدول زیر توزیع مصرف تریاک (بر حسب کرم در روز) را نزد مردان وزنان نشان میدارد :

جمع		زن		مرد		جنس	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	مصرف به کرم	
۱	۱	۰	۰	۱/۳	۱	۰/۰	
۵	۵	۱۴/۳	۲	۷/۵	۲	۱	
۱۶	۱۶	۱۴/۳	۳	۱۱/۴	۳	۲	
۲۱	۲۱	۲۸/۶	۶	۱۹/۰	۱۰	۳	
۹	۹	۹/۰	۳	۸/۳	۷	۴	
۳۴	۳۴	۲۳/۸	۵	۳۶/۷	۷۹	۵	
۳	۳	۰۰	۰	۳/۸	۷	۶	
۴	۴	۰	۰	۵/۱	۶	۷	
۵	۵	۴/۸	۱	۵/۱	۴	۸	
۶	۶	۴/۸	۱	۶/۳	۵	۱۰	
۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		پیچ	

همانطور که از جدول فوق استنباط می شود حداقل مصرف تریاک نزد مردان ۵/۰ کرم در نزد زنان ۱/۰ کرم در روز است . وحد اکثر مصرف روزانه در نزد مردان وزنان ۰/۱ کرم است . اکثریت مردان (۱/۷ درصد) روزانه ۵ کرم مصرف می کنند ولی اکثریت زنان (۶/۲۸ درصد) روزانه ۳ کرم تریاک مصرف می کنند .

۵/۰۸ درصد از مردان و ۵/۹۰ درصد از زنان بین ۲ تا ۵ کرم تریاک مصرف می کنند .

ب: تعداد سالهای اعتیاد

جدول زیر توزیع زنان و مردان را بر حسب سالهای اعتیاد نشان میدهد:

جمع		زن		مرد		جنس سالهای اعتیاد
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۳	۳	۰	۰	۲/۸	۷	۵-۲
۲۷	۲۷	۲۳/۳	۲	۶۰/۳	۲۰	۱۰-۱۴
۲۷	۲۷	۴۲/۹	۱	۷۲/۸	۱۸	۱۰-۱۹
۱۷	۱۷	۱/۰	۲	۱۹/۰	۱۰	۷۰-۲۴
۱۹	۱	۴/۸	۱	۱۰/۱	۸	۷۰-۲۶
۵	۵	۰	۰	۶/۳	۵	۷۰-۳۴
۷	۷	۱/۰	۲	۶/۳	۰	۳۵-۳۶
۴	۴	۰	۰	۵/۱	۴	۴۰-۴۴
۱	۱	۰	۰	۱/۳	۱	۴۵-۴۹
۱۰۰		۱۰۰	۲۱	۱۰۰	۷۶	جمع

حد اقل سالهای اعتیاد در زن زنان ۷ و در مرد مردان ۱۰ سال و حد اکثر سالهای اعتیاد برای مردان ۵۴ و برای زنان ۵۵ سال میباشد. بیش از ۸۰ درصد از مردان و بیش از ۶۰ درصد از زنان دارای سابقه اعتیاد بین ۱۰ تا ۲۹ سال بوده‌اند.

ن : تعیین رابطه مصرف تریاک با سالهای اعتیاد نزد مردان

برای تعیین رابطه بین مصرف روزانه تریاک با سالهای اعتیاد باید از فرمول ضریب همبستگی استفاده نمود و میزان و پیشت « همبستگی را محاسبه کرد و سپس معارله این همبستگی را صیغه نمود .

اگر مصرف روزانه تریاک را به y رسالهای اعتیاد را به x درجه همبستگی را با r نمایش دهیم برای تعیین درجه همبستگی باید از فرمول زیراستفاده کرد :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

مقادیر این فرمول براساس اندازه‌گیریهای انجام شده از اینقرار است :

$$n = 79$$

$$\sum x = 1626$$

$$\sum x^2 = 40416$$

$$\sum y = 362$$

$$\sum y^2 = 2011$$

$$\sum xy = 7874$$

$$(\sum x)^2 = 2643876$$

$$(\sum y)^2 = 131769$$

$$\sum x \sum y = 590238$$

$$n \sum x^2 = 3112864$$

$$n \sum y^2 = 108869$$