

۱۳۴۷-۱۱-۱۷
۱۳۴۷-۱۱



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه زمین شناسی

رساله جهت اخذ مدرک دکتری Ph.D.

زمین شناسی اقتصادی

عنوان

مقایسه کانی شناسی، ژئوشیمی و ژئوکانسارهای فلوریت

منطقه سوادکوه وارانه مدل اکتشافی آنها



استاد راهنمای

دکتر احمد خاکزاد

۱۳۴۷/۱۰/۹

اساتید مشاور

دکتر ایرج رسae-دکتر میر رضا موسوی

نگارنده

قربان وهاب زاده کبریا


نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶-۸۷

بسمه تعالیٰ
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
تأییدیه دفاع از رساله دکتری

این رساله توسط آقای قربان وهاب زاده کبریا دانشجوی دوره دکتری رشته زمین شناسی
اقتصادی تحت عنوان مقایسه کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسارهای فلوریت
منطقه سواد کوه و ارائه مدل اکتشافی آنها در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ مورد دفاع قرار


گرفت و براساس رأی هیأت داوران با نمره ۱۸/۴. و درجه سینه خوب پذیرفته شد.

استاد راهنمای آقای دکتر احمد حاکزاد 


استاد مشاور آقای دکتر ایوج رساء 


استاد مشاور آقای دکتر میورضا موسوی 

داور از دانشگاه آقای دکتر محمد بزدی 

داور از دانشگاه آقای دکتر مهرداد بهزادی 

۱۳۸۷/۱۰/۶ -

داور خارج از دانشگاه آقای دکتر سید جواد مقدمی 

داور خارج از دانشگاه آقای دکتر مجید قادری 

به پدر مرحوم و مادر فدا کار

و تقدیم به همسر عزیز و همسراه همیشگی زندگی ام

که این رساله مدیون اوست

سپا سگزاری:

اکنون که به لطف ایزد منان این پایان نامه به انجام رسیده، لازم است باذکر نام از یکایک افراد حقیقی و حقوقی که در این پژوهش نقش داشته اند، تشکر و قدر دانی شود.

۱- نخست از جناب آقای دکتر احمد خاکزاد به عنوان استاد را هنمای این رساله که یقیناً بدون را هنمایی های خردمندانه و همکاری صمیمانه ایشان این تحقیق میسر نمی شد.

۲- از جناب آقای دکتر ایرج رسae بعنوان استاد مشاور اول این پایان نامه که از کمک های ارزشمندشان برخور دار شده ام.

۳- از جناب آقای دکتر میر رضا موسوی بعنوان استاد مشاور دوم که در مطالعه مقاطع نازک کمک فراوانی نموده اند.

۴- از مسئولین محترم دانشکده علوم زمین بویژه جناب آقایان دکتر سید محمد پور معافی معاونت محترم تحصیلات تكمیلی و دکتر محسن پور کرمانی مدیر محترم گروه زمین شناسی بخاطر فراهم کردن امکانات مورد نیاز.

۵- از داوران محترم مقاله جهت مطالعه پایان نامه و ارائه پیشنهادات سود مند

۶- از جناب آقای دکتر مسعودی در دانشگاه تربیت معلم بخار طر همکاری سخاوتمندانه در استفاده از دستگاه مطالعه میانبارهای سیال.

۷- از اداره کل صنایع و معادن مازندران بخار طر تامین بخشی از هزینه مالی این پایان نامه.

۸- از آقای مهندس اصغر پور بخاطر همکاری در کارهای کامپیوتروی.

۹- از همسرم برای همکاری در صحرا، تهییه عکسهای زیبا و ترسیم اشکال.

۱۰- از همه عزیزانی که به نحوی در انجام این کار شریک بوده اند ولی از قلم افتاده اند.

اقرار و تعهدنامه

اینجانب قربان وهابزاده کبریا
دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی،
دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی رشته زمین
شناسی، گرایش اقتصادی رساله حاضر را بر اساس
مطالعات و تحقیقات شخصی خود انجام داده و در
صورت استفاده از داده‌ها، مأخذ، منابع و نقشه‌ها
به طور کامل به آن ارجاع داده‌ام، ضمناً داده‌ها و
نقشه‌های موجود را با توجه به مطالعات میدانی -
صحرائی خود تدوین نموده‌ام. این رساله پیش از
این به هیچ‌وجه در مرجع رسمی یا غیر رسمی دیگری
به عنوان گزارش یا طرح تحقیقاتی عرضه نشده است.
در صورتی که خلاف آن ثابت شود، درجه‌ی
دريافتی اينجانب از اعتبار ساقط شده، عواقب و
نتایج حقوقی حاصله را می‌پذيرم.

تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵

امضاء

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با طولهای جغرافیایی $5^{\circ} 52' - 5^{\circ} 40'$ و عرض های جغرافیایی $36^{\circ} 5' - 5^{\circ} 25'$ در شرق البرز مرکزی قرار دارد. در این منطقه کانسارها ای فلوریت از غرب به شرق به ترتیب شامل بایجان، دراسله، اشچال، شش روبار، کهریزه سرچالشک، امافت، پاچی - میانا و اراء می باشند. منطقه مورد نظر از نظر ساختمانی متعلق به بخش شمالی البرز مرکزی بوده که در تقسیم بنده اشتولکین در زون شمالی - مرکزی قرار می گیرد [۱۵ و ۹]. به جز کانسار امافت که در سازند تیز کوه قرار دارد [۲۹]، بقیه در بخش میانی - پلا لایی سازند ایکا بالیتوژی آهک - دولومیت جا گرفته اند. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی قشان، می دهد که به طور کلی تمرکز ماده معدنی دردو مرحله انجام گرفته است، مرحله اول (رسوبی و دیاژنتیکی) همخوان با لایه بندی بوده و عمدها به شکل های عدسی و لایه ای دیده می شوهد. به تقلیر می رسد که این تمرکز در هنگام رسوب گذاری بخش میانی سازند ایکا و هم زمان با آن و در طی مراحل دیاژنر به وجود آمده است. در مرحله دوم بصورت گسلی شکل گرفته که این رخداد به اختلال زیاد مربوط به اولین فاز کوهزایی البرز پس از سیمیرین پیشین یعنی در کرتاسه پالایی - پالئوسن می باشد [۱۷]. در کانسار بایجان ماده معدنی در بخش شمالی به صورت عدسی شکل و شو بخش جنوبی گسلی و فضای خالی را پر نموده، در حالیکه در کانسار در اسله تمرکز اقتصادی فلوریت صرافگسلی و در اشچال هیچگونه شواهدی از فلوریت اپی ژنتیک مشاهده نگردیده و همراه معدنی به صورت عدسی یا لایه ای در چند افق مختلف تشکیل شده اند. کانسار کمر پشت در بخش شمالی دارای عدسیهای کوچکی از فلوریت و باریت بوده، ولی بیشترین حجم ذخیره فلوریت در زون گسلی کانسار در جنوب واقع شده است. در معدن امافت، فلوریت گسل ها و شکستگی ها را پس نموده که عموماً امتداد لایه هارا قطع کرده اند. در پاچی میانا تجمعات فلوریت هم بصورت دیاژنتیک (بخصوص عدسی شکل) و هم بصورت اپی ژنتیک در حد اقتصادی تشکیل شده اند. کانسار اراء در زون راندگی به وجود آمده و دارای چندین کیلومتر طول و ضخامت اندک است. این کانسارها از تقطیر کانی شناسی ساده هستند، و اغلب پاراژنر فلوریت، باریت، گالن و اسفالریت دارند. در بعضی از کانسارها کانی های پیریت، کوولیت، سلسیت، اسمیت زونیت، سروزیت و آلونیت نیز مشاهده می گردند. بافت ماده معدنی شامل پراکنده و افسان، فراگمنتال، برشی، جانشینی، پرکننده فضایی (Diagenetic Crystalization Rhytmite DCR) می باشد. دگرسانی کانسارهای متشکله خالی و عموماً سیلیسی، دولومیتی و کائولینیتی است. در کانسار کمر پشت به دلیل مجاورت تووده ماجمایی آلکالن، هاله دگرسانی پیریتی و آلونیتی رخ داده و نیز در کانسار بایجان به دلیل نفوذ دایک دیابازی کانی ژاروسیت در محل تماس سازند پالند به وجود آمده که آنها را از سایر کانسارها متمایز می کنند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه عنصر REE، الگوی بهنجار شده فلوریت های دیاژنتیکی و اپی ژنتیک و سنگ میزبان آنها مشابه است. همین نتایج نشان می دهند که الگوهای بهنجار شده فلوریت با الگوهای بهنجار شده سنگ های ماسه سنگ هاو ماسه سنگ های منطقه تقawat بارزی دارند. علاوه بر این مقادیر REE و روند تغییرات و الگوی بهنجار شده سنگ های آذرین و فلوریت نشان می دهد که در

دو معدن کمپیشت و بایجان تحرک و جابجایی عناصر رخداده و این توده‌ها در ترکیب شیمیایی فلوریت اثر گذاشته‌اند. رسم نسبت‌های $\frac{Tb}{Yb}$, $\frac{La}{Yb}$, $\frac{Yb}{La}$, $\frac{Tb}{Ca}$, $\frac{La}{Ca}$, $\frac{Tb}{Yb}$ ثابت می‌کنند که پدیده انحلال و انتقال در ذخایر فلوریت رسوبی - دیاژنتیکی اتفاق افتاده و سپس در زون گسلی رسوب نموده و فلوریت اپیژنتیک را تشکیل داده است [۱۶، ۶۴]. این رخداد به احتمال زیاد به فاز کوهزایی کرتاسه بالایی - پالئوسن مربوط است [۱۶]. تغییرات ایزوتوب‌های اکسیژن و کربن در سنگ‌های کربناتی نزدیک به کانسار فلوریت اmafت زیادبوده، به طوریکه ترکیب ایزوتوبی این دو عنصر در مجاورت رگه فلوریت سبک می‌شود. این تغییرات برای اکسیژن از $-1/3$ تا $-11/2$ (مجاورت رگه) و برای کربن از $-2/3$ تا $-2/6$ (مجاورت رگه) محاسبه شده است. همچنین با استفاده از مطالعه ایزوتوب‌های اکسیژن درصد دگرسانی سنگ‌های کربناته اطراف رگه فلوریت بین ۷ تا ۸۸ درصد و براساس ایزوتوب کربن بین $11/6$ تا $2/6$ درصد به دست آمده است [۱]. دمای تشکیل هاله دگرسانی بر اساس همین روش (درصد دگرسانی اکسیژن $114^{\circ}C$) محاسبه گردید که با دمای حاصل از روش میکروترمومتري در کانی فلوریت بامیانگین $139^{\circ}C$ درجه سانتی گراد (نه هاله دگرسانی) سازگار است. نتایج نشان می‌دهند که گوگرد های سنگین موجود در باریت‌های منطقه از یک سیستم Rayleigh (که در محیط رسوبی تریاس میانی حاکم بوده، منشاء گرفته است. با توجه به اینکه مقدار $S^{34}\delta$ در باریت (میانگین $37/13$) به اندازه $38/12$ (میانگین) در هزار با مقدار $S^{34}\delta$ گالن (میانگین $99/9$) تفاوت دارد. به نظر می‌رسد سازو کار مؤثر، باکتریهای احیاکننده سولفات یوده که در تولید گوگرد احیایی گالن نقش داشته‌اند [۳۶]. میانبارهای سیال کانی فلوریت مورد مطالعه پتروگرافی و میکروترمومتري قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از پتروگرافی بیشتر میانبارهای سیال در فلوریت از نوع ردیف شده (Trail)، مجزا (Isolated) خوش‌های (Cluster) و پراکنده هستند. همین نتایج نشان می‌دهند که میانبارهای سیال از نظر ترکیب فازی به سه صورت تک فازی غنی از مایع آبگین، تک فازی غنی از گاز، دو فازی مایع و گاز و به ندرت سه فازی مایع آبگین، CO_2 و گاز وجود دارند [۶۴]. دمای همگن شدگی میانبارهای سیال در کانسه‌های فلوریت در این کانسارها از 90 الی 200 درجه و دارای میانگین حدود $139^{\circ}C$ محاسبه گردید. در کانسارهای که خصوصیات رسوبی - دیاژنتیکی شدید از خود نشان می‌دهند دمای همگن شدگی آنها کمتر از کانسارهای صرفاً اپیژنتیک می‌باشند. شوری این میانبارها از 15 الی 27 درصد وزنی معادل $NaCl$ به دست آمد که بسیار بالا و با منشاء شوراب حوضه‌ای سازگار است. این داده‌ها نشان میدهد که این کانسارها جزء کانسارهای سرب و روی MVT دما پایین از نوع ایرلندي (Irish-Type) با زیر رده فلوریت هستند [۵۱]. برای بی‌جویی این کانسارها بخش میانی سازند الیکا و بخش‌های گسلی سازندهای آهکی لار و تیز کوه مناسب است.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱	-۱- مقدمه
۲	-۲- گسترش جغرافیایی کانسارها
۳	-۳- راههای دسترسی
۴	-۴- آب و هوا
۵	-۵- نیروی کار
۶	-۶- تاریخچه معدنکاری
۷	-۷- معدن شش رو دیار
۸	-۸- معدن پاچی میانا
۹	-۹- معدن فلوریت کمرپشت
۱۰	-۱۰- تاریخچه مطالعات
۱۱	-۱۱- اهداف مطالعه
۱۲	-۱۲- روش مطالعه
۱۳	-۱۳- نمونه برداری
۱۴	-۱۴- مطالعات آزمایشگاهی

فصل دوم- زمین شناسی

۱۳	-۱- پهنه رسوی، ساختاری البرز
۱۴	-۲- تقسیم‌بندی ساختاری البرز مرکزی
۱۵	-۳- پالئوژئوگرافی و حرکات کوه‌زایی البرز
۱۶	-۴- چینه‌شناسی ناحیه‌ای
۱۷	-۱-۴-۲- پرمین
۱۸	-۲-۴-۲- تریاس
۱۹	-۱-۲-۴-۲- تکتو نیک و جغرافیای ایران در زمان تریاس
۲۰	-۲-۴-۲- لیتو استراتیگرافی سازند الیکا در برش نمونه
۲۱	-۳-۴-۲- ژوراسیک
۲۲	-۴-۴-۲- کرتاسه
۲۳	-۵-۴-۲- فعالیتهای آذرین در البرز مرکزی

۲۷	۵-۱-زمین‌شناسی کانسارهای فلوریت
۲۷	۵-۲-نهشته‌های برونزاد
۲۷	۵-۳-نهشته‌های درونزاد
۲۷	۵-۴-نهشته‌های هیپوترمال
۲۷	۵-۵-نهشته‌های مزوترمال
۲۸	۵-۶-نهشته‌های اپی ترمال
۲۸	۶-۱-زمین‌شناسی محدوده معادن
۲۹	۶-۲-معدن بایجان
۳۲	۶-۳-معدن شش‌رودبار، اشچال، دراسلہ
۳۵	۶-۴-معدن کمریشت و سرچلشک
۳۹	۶-۵-معدن امافت
۴۳	۶-۶-معدن پاچی - میانا
۴۴	۶-۷-معدن اراء
۴۵	۷-۱-سنگ میزبان کانسارها

فصل سوم- کانی‌شناسی و دگر سانی

۵۰	۱-۱-کانی‌شناسی
۵۷	۱-۲-ویژگی‌های کانی‌شناسی کانسارها
۶۷	۱-۳-کانسار بایجان
۶۰	۲-۱-کانسار دراسلہ
۶۲	۲-۲-کانسار اشچال
۶۳	۲-۳-کانسار شش‌رودبار
۶۵	۲-۴-کانسار کمریشت
۶۸	۲-۵-کانسار سرچلشک
۷۸	۲-۶-کانسار امافت
۷۰	۲-۷-کانسار پاچی میانا
۷۳	۲-۸-کانسار اراء
۷۵	۳-۱-دگر سانی کانسارها
۷۸	۴-۱-سکانس پاراژنتیک
۷۹	۵-۱-افق‌های کانه دار در کانسارهای شرق البرز مرکزی
۷۹	۵-۲-ویژگی‌ها و تفاوت‌های کانسارهای فلوریت منطقه

فصل چهارم-عناصر کمیاب و نادر خاکی

۱-۴	ژئوشیمی عنصر فلورور	
۸۲	
۱-۴	زمین شیمی عناصر نادر خاکی	
۸۳	
۱-۴	روش تجزیه عناصر	
۸۴	
۱-۴	الگوی تغییرات عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت کمرپشت	
۹۰	
۱-۴	الگوی تغییرات عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت سرچلشک	
۹۲	
۱-۴	الگوی تغییرات عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت امافت	
۹۳	
۱-۴	الگوی تغییرات عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت بایجان	
۹۶	
۱-۴	تفسیر الگوی شش رودبار و پاچی میانا	
۹۷	
۱-۴	نرمالیز Ce در برابر نرمالیز Eu	
۹۸	
۱-۱۰	نسبت های $\frac{Tb}{La}, (REE/Ca)$	
۱۰۱	
۱-۱۱	نسبت های $\frac{Yb}{La}, \frac{Yb}{Ca}$	
۱۱۲	
۱-۱۲	نسبت های $(\frac{Tb}{Yb})Cn, (\frac{La}{Yb})Cn$	
۱۰۴	
۱-۱۳	زمین شیمی عناصر اصلی و کمیاب	
۱۰۵	
۱-۱۳	۱-۱-۱- عنصر Sr	
۱۰۵	
۱-۱۳	۲-۱-۳- عناصر Y	
۱۰۶	
۱-۱۳	۳-۱-۳- عنصر Ti	
۱۰۶	
۱-۱۳	۴-۱-۳- عنصر Ba	
۱۰۷	
۱-۱۳	۵-۱-۳- عناصر U و Th	
۱۰۷	
۱-۱۴	۱۴- ترکیب شیمیایی کانی گالن	
۱۱۷	

فصل پنجم - مطالعه ایزو توپ های پایدار

۱-۵	مطالعه ایزو توپ اکسیژن و کربن	
۱۱۰	
۱-۵	۱- تعیین دگرسانی سنگ میزبان	
۱۱۳	
۱-۵	۲- محاسبه دمای تشکیل هاله دگرسانی	
۱۱۴	
۱-۵	۳- مطالعه ایزو توپ گو گرد	
۱۱۵	
۱-۵	۱- مقدار S^{34} باریت و گالن در کانسارها	
۱۱۶	
۱-۵	۲- منشاء گو گرد	
۱۱۸	
۱-۵	۳- منشاء گو گرد باریت	
۱۱۹	

۱۲۰	۵-۲-۲-منشاء گو گرد گالن
۱۲۲	۵-۳-نتیجه گیری

فصل ششم-مطابعه میانبارهای سیال

۱۴۴	۶-۱-مقدمه
۱۴۵	۶-۲-روش نمونه برداری
۱۴۶	۶-۳-مطالعات میکروسکوپی و پتروگرافی میانبارهای سیال
۱۴۷	۶-۴-معدن بایجان
۱۴۸	۶-۵-معدن پاچی میانا
۱۴۹	۶-۶-معدن اشچال
۱۵۰	۶-۷-معدن شش رو دبار
۱۵۱	۶-۸-معدن امافت
۱۵۲	۶-۹-داده های زمین دماسجی (میکروترمو متري) کانی فلوريت
۱۵۳	۶-۱۰-معدن بایجان
۱۵۴	۶-۱۱-معدن پاچی میانا
۱۵۵	۶-۱۲-معدن اشچال
۱۵۶	۶-۱۳-معدن شش رو دبار
۱۵۷	۶-۱۴-معدن امافت
۱۵۸	۶-۱۵-تعیین چگالی سیالات کانه دار
۱۵۹	۶-۱۶-مکانیسم تشکیل و نوع کانسارهای منطقه بر اساس میانبار سیال
۱۶۰	۶-۱۷-معدن بایجان
۱۶۱	۶-۱۸-معدن پاچی میانا
۱۶۲	۶-۱۹-معدن اشچال
۱۶۳	۶-۲۰-معدن شش رو دبار
۱۶۴	۶-۲۱-معدن امافت
۱۶۵	۶-۲۲-تعیین مولالیته میانبار سیال
۱۶۶	۶-۲۳-نتایج حاصل از مطالعه میانبار سیال

فصل هفتم-نتیجه گیری و نحوه تشکیل کانسارها

۱۶۷	۷-۱-شواهد و راهنمایی‌های ژنتیکی
۱۶۸	۷-۲-۱-۱-مقدمه
۱۶۹	۷-۲-۱-۲-گسترش ناحیه‌ای کانسارهای فلوریت
۱۷۰	۷-۲-۳-شکل ماده معدنی و بافت و ساخت آن

۱-۱-۴- عدم ارتباط کانی سازی با توده‌های ماقمایی	۱۶۳
۱-۱-۵- ارتباط بخشی از کانی سازی با گسل‌ها و شکستگی‌ها	۱۶۳
۱-۱-۶- عدم ارتباط بخشی از کانی سازی فلوریت با گسل‌ها	۱۶۴
۱-۱-۷- ارتباط کانی زایی فلوریت به افق‌های خاص چینه‌شناسی	۱۶۴
۱-۱-۸- حضور طبقات توفی	۱۶۴
۱-۱-۹- میانگین عناصر Pb , Ba , F در سنگ میزان	۱۶۴
۱-۱-۱۰- افزایش چشمگیر SiO_2 در بخش بالایی سازند الیکا	۱۶۴
۱-۱-۱۱- نسبت $\frac{Sr}{Ba}$ در سنگ‌های آذرین	۱۶۵
۱-۱-۱۲- پالئوژن‌گرافی و وضعیت حوضه رسوی	۱۶۵
۱-۱-۱۳- مطالعه ایزوتوپ‌های پایدار	۱۶۶
۱-۱-۱۴- ترکیب شیمیایی گالن	۱۶۶
۱-۱-۱۵- دگر سانی	۱۶۷
۱-۱-۱۶- شواهد میانبار سیال	۱۶۷
۱-۱-۱۷- داده‌های REE	۱۶۸
۱-۱-۱۸- مقایسه ویژگی‌های اساسی کانسار‌ها	۱۶۸
۱-۲- منشاء عناصر در کانسارهای MVT و فلوریت شرق البرز مرکزی	۱۷۰
۱-۳- ارائه مدل ژنتیکی کانسارهای فلوریت	۱۷۱
۱-۳-۱- مرحله رسوی - دیاژنتیک	۱۷۲
۱-۳-۲- مرحله پس از دیاژنز	۱۷۰
۱-۴- نوع و جایگاه کانسارهای منطقه	۱۷۷
۱-۵- پیشنهادات	۱۸۱

فصل هشتم- منابع و پیوست‌ها

۱-۱- منابع فارسی	۱۸۵
۱-۲- منابع انگلیسی	۱۸۷
۱-۳- پیوست‌ها	۱۹۰
۱-۳-۱- پیوست شماره ۱ (آزمایش XRD)	۱۹۱
۱-۳-۲- پیوست شماره ۲ (آزمایش XRF)	۲۲۷
۱-۳-۳- پیوست شماره ۳ (آزمایش ICP-MS)	۲۲۸
۱-۳-۴- پیوست شماره ۴ (تجزیه گالن)	۲۳۷
۱-۳-۵- پیوست شماره ۵ (تجزیه ایزوتوپی)	۲۳۹

فصل یک:
گلیات

۱-۱ مقدمه

فلوریت مهمترین کانی فلور در طبیعت است. این کانی در سیستم مکعبی متبلور می‌شود و می‌تواند عناصر نادر خاکی را در شبکه خود جای دهد. فلوریت در طیف وسیعی از شرایط زمین‌شناسی به وجود می‌آید و در تمام شرایط رسوبی، آذرین و دگرگونی می‌تواند یافت شود [۲۰، ۲۲، ۵۵]. این کانی معمولاً با نهشته‌های مهم سرب، روی و باریت همراه است و از این جهت اهمیت خاصی دارد. چرا که پی‌جويی و اكتشاف آن می‌تواند به کشف نهشته‌های مذکور نیز منجر شود. همچنین ضمن استخراج و پرعيار کردن اين کانی و کانی‌های همراه نیز قابل استحصال است و اين خود موجب بالرژش‌تر شدن نهشته‌های فلورین می‌شود. گاهی نیز وجود فلوریت، خود موجب ارزشمندتر شدن نهشته‌های دیگر کانی‌ها می‌شود. از این رو باستی در بررسی‌های فنی-اقتصادی نهشته‌های سرب، روی، باریت و فلوریت به کانی‌های همراه توجه خاصی مبذول داشت زیرا این کانی‌ها ممکن است در اقتصادی شدن یک کانسار، تأثیر بسیاری داشته باشند.

هدف از این رساله، مطالعه کانسارهای فلوریت (باریت، سرب و روی) منطقه شرق البرز مرکزی است. این مطالعه شامل بررسی‌های صحرایی کانسارها، کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی و XRD، ژئوشیمی (بخصوص عناصر نادر خاکی)، بررسی ایزوتوب‌های پایدار کانسارها (اکسیژن، کربن و گوگرد) و مطالعه میانبارهای سیال می‌باشد. در فصل اول این پایان‌نامه، راجع به ویژگی‌های مختلف فلوریت، ژئوشیمی، پراکندگی و گسترش آن، زمین‌شناسی و نحوه اكتشاف و استخراج، پیشینه مطالعات، اهداف و روش مطالعه آورده شده است.

فصل دوم شامل زمین‌شناسی عمومی و ناحیه‌ای، چینه‌شناسی سازندهای دارای رخنمون، ارتباط آنها با یکدیگر و افق‌های کانه‌دار و نیز خصوصیات میکروسکوپی سنگ میزان کانسارهای فلوریت به کمک مقاطع نازک است. در فصل سوم به کانی‌شناسی و دگر سانی کانسارها پرداخته و از دو روش XRD و مقاطع صیقلی سود جسته شده است. در فصل چهارم ژئوشیمی کانسارها بخصوص عناصر REE مورد توجه قرار گرفته است. در فصل پنجم ایزوتوب‌های پایدار شامل اکسیژن، کربن و گوگرد کانسار مطالعه شده است.

فصل ششم ویژگی‌های میانبارهای سیال کانی فلوریت در کانسارها بررسی شده است. در فصل هفتم با توجه به نتایج حاصل از فصل‌های گذشته، نحوه تشکیل کانسارهای فلوریت شرق البرز مرکزی ارائه شده و پیشنهادی جهت ادامه مطالعات بیان گردیده است. در فصل هشتم ضمایم و منابع مربوط به پایان‌نامه آمده است.


۱-۲ گسترش جغرافیایی کانسارها:

منطقه مورد مطالعه با طول‌های جغرافیایی 15° - $53^{\circ} 40'$ و عرض‌های جغرافیایی $29^{\circ} 50'$ - $32^{\circ} 50'$ شرق البرز مرکزی حد فاصل جاده هراز در غرب وجاده ساری-دامغان در شرق قرار دارد. در این منطقه ۹ کانسار فلوریت بصورت زنجیره‌ای در طول نوار باریکی به عرض 30 کیلومتر و طول 150 کیلومتر پراکنده اند. (شکل های ۱-۱۹-۲). به دلیل مقاومت فیزیکی و شیمیایی نسبتاً بالای سازند الیکا، این سازند معمولاً صخره ساز بوده و ارتفاعات و ستیغ‌های بلند بخش شمالی البرز را تشکیل می‌دهد. حداقل ارتفاع رختمون فلوریت در مناطق جنگلی 1300 متر و در مناطق مرتفع و کوهستانی سرد تا ارتفاع 2700 متری دیده می‌شود. موقعيت جغرافیایی این کانسارات و معادن به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:



- معدن بایجان در 6 کیلومتری جنوب آمل و در ارتفاع تقریبی 1750 متری در جنوب روستای بایجان جای گرفته است.
- معدن دراسلہ در 35 کیلومتری جنوب زیرآب و 3 کیلومتری شمال روستای دراسلہ و در ارتفاع 3000 متری واقع گردیده است.
- معدن اشچال در 5 کیلومتری شمال شرق معدن دراسلہ و در ارتفاع 1950 متری واقع است.
- معدن شش روبار در فاصله 10 کیلومتری شمال معدن دراسلہ واقع شده که تا شهر زیرآب 3 کیلومتر فاصله دارد. ارتفاع آن از 1300 تا 1700 متر متغیر است.
- معدن کمرپشت در فاصله 15 کیلومتری پل سفید و در ارتفاع 1900 متری واقع شده است.
- معدن سرچلشک در 2 کیلومتری شرق معدن کمرپشت و در ارتفاع 1400 متری واقع شده است.
- معدن امافت در ارتفاع 1900 متری و در 5 کیلومتری معدن سرچلشک قرار دارد.
- معدن پاچی‌میانا در 40 کیلومتری شرق پل سفید و در ارتفاع 1600 متری قرار دارد.
- معدن اراء در 90 کیلومتری جنوب شرق ساری و جنوب روستای اراء و دارای ارتفاع -2000 1800 متر می‌باشد.

۱-۳ راه‌های دسترسی:

استان مازندران به خاطر آب و هوای مناسب، از تراکم جمعیتی بالایی حتی در ارتفاعات برخوردار است. روستاهای کوچک و پراکنده در اغلب ارتفاعات استان مازندران وجود دارند که از روزگاران قدیم چاده‌هایی جهت رفت و آمد به آنها احداث شده است و اکنون بعضی از آنها مورد استفاده معادن قرار می‌گیرند، زیرا اغلب در نزدیکی معادن آبادیهای کوچک وجود دارد (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱ نکشه پیراکندگی کانسپارهای فلوریت و راههای دستبر سی مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰



0

50 Kilometers



محل کانسار
گسل


شکل ۱-۲- تصویر ماهواره ای منطقه با سنجنده ETM و محل کانسارها

۴-۱ آب و هوا


وضعیت آب و هوایی منطقه متغیر و تابع ارتفاع و موقعیت جغرافیایی است. آن دسته از معادن که در مناطق جنگلی و حاشیه جنگل قرار دارند از بارندگی زیاد برخوارداربوده و به لحاظ دما معتدل هستند. دسته‌ای که در نقاط مرتفع و مرتعی قرار دارند، دارای زمستان‌های بسیار سرد و تابستان‌های معتدل هستند. در اغلب معادن فلوریت استان ۲۵۰ روز از سال را می‌توان فعالیت معدن کاری نمود. شکل‌های ۳-۱ و ۴-۱ به ترتیب وضعیت دما و بارندگی را در منطقه سوادکوه نشان می‌دهند.

۴-۵ نیروی کار

وجود آبادی‌های کوچک و پراکنده در اغلب مناطق ارتفاعی استان باعث شده تا تأمین نیروی کار به سادگی انجام شود. معادن فلوریت استان معمولاً کوچک بوده و پرسنل آن حدود ۲۰ نفر یا کمتر است، بنابراین مشکلی در تأمین نیروی کار وجود ندارد. هر روز کارگران با وسائل نقلیه از شهرها و روستاهای اطراف به معادن رفته و در پایان روز به محل زندگیشان بر می‌گردند.



شکل ۳-۱ کمینه و بیشینه دمای ماهیانه ایستگاه هواشناسی پل‌سفید (۱۳۸۴)



شکل ۱-۴ میزان بارش ماهیانه ایستگاه پل سفید (۱۳۸۴)

۱-۸ تاریخچه معدنکاری

بیشتر معدن‌فلوریت منطقه، در سالهای اخیر اکتشاف گردیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. فقط ۳ کانسار شش رودبار، پاچی میانا و کمرپشت دارای سابقه معدن‌کاری هستند که در زیر خلاصه‌ای از آنها ارائه می‌شود.

۱-۸-۱ معدن شش رودبار

برخی کانسار شش رودبار را معدن سرب متروکه از سال ۱۳۳۵ ذکر می‌کنند. کانسار شش رودبار در سال ۱۳۶۸ به لحاظ دارابودن پتانسیل خوبی از فلوریت، توسط بخش خصوصی (شرکت فلوریت مازندران) مورد بهره‌برداری قرار گرفت. روند بهره‌برداری همواره یکسان نبوده و به دلائل مختلف از جمله متغیر بودن کیفیت ماده معدنی از نظر درصد خلوص و باطله و تغییرات قیمت فروش و ... گاهی کند صورت گرفته است. استخراج عموماً به دو طریق رو باز (در فصول گرم) و زیرزمینی و تونلی (در فصول سرد) انجام می‌شود و معمولاً کار بهره‌برداری در طول سال ادامه دارد. تعداد ترانشه‌ها و تونل‌های استخراجی و اکتشافی بالغ بر ۲۰ دهانه می‌باشد. استخراج به صورت انفجاری بوده و پس از حمل توسط کارگران، ماده معدنی به صورت دستی سنگ‌جوری می‌شود [۵].